


Ueber
einen Fall von Rachitis.

(Mit einer Tafel.)

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doctorwürde
unter dem Präsidium
des Herrn
PROF. D^R. OTTO BOLLINGER
der
hohen medicinischen Facultät zu München
vorgelegt von
Franz Xaver Heissler
prakt. Arzt aus Eichstätt.

München, 1883.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Ueber
einen Fall von Rachitis.

(Mit einer Tafel.)

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doctorwürde
unter dem Präsidium
des Herrn
PROF. D^R. OTTO BOLLINGER
der
hohen medicinischen Facultät zu München

vorgelegt von

Franz Xaver Heissler

prakt. Arzt aus Eichstätt.

München, 1883.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

SEINEN THEUREN ELTERN

IN

DANKBARER LIEBE

GEWIDWET

VOM VERFASSEN.

Die Rachitis — Rachitismus, englische Krankheit, morbus anglicus, doppelte Glieder, articuli duplicati, Zwiewuchs — ist eine dem Kindesalter eigenthümliche Ernährungsanomalie, deren Wesen in einer übermäßigen Wucherung, aber ungenügenden Verkalkung des zur Verknöcherung bestimmten Gewebes besteht.

Dafs diese Krankheit schon im Alterthume vorgekommen ist, dürfte kaum zu bezweifeln sein. Nach Stiebel soll eine antike Bildsäule des Dichters Aesop Körperverunstaltungen zeigen, wie sie der Rachitis eigen sind. Bei Hyppokrates (de articulis), Galen, Celsus, Zacutus will man Andeutungen über diese Krankheit gefunden haben. Dafs diese Autoren aber die Rachitis nicht als eine eigene Krankheit aufgefaßt haben, scheint mir nicht bezweifelt werden zu können; denn es wäre im höchsten Grade auffallend, dafs auch nicht ein einziger dieser Männer an irgend einer Stelle sich eingehender mit dieser merkwürdigen Krankheit befaßt haben sollte.

Erst aus dem 16. Jahrhunderte haben wir Mittheilungen durch Reusner, Formius und Schenk über das durchaus nicht seltene Vorkommen der Rachitis in der Schweiz, in Frankreich, Holland und Deutschland.

Befonderes Studium und eine eingehendere Bearbeitung erfuhr unsere Krankheit erst im 17. Jahrhunderte, als eine auffallende Verbreitung derselben in England die Aufmerksamkeit der englischen Aerzte erregte und eine eingehende Unter-

fuchung durch einen eigens zu diesem Zwecke gebildeten Ausschufs, bestehend aus Glifson, Bate und Regemorter, veranlafste, deren Ergebnisse Glifson 1650 veröffentlichte. Diefes gab der Krankheit in Rückficht auf die hauptsächlich dabei betheiligte Wirbelfäule — *ράχις* — zuerst den Namen »Rhachitis«.

Von nun an häuften sich die Veröffentlichungen über Rachitis, und es wurden verschiedene Hypothesen über die Urfachen und das Wesen der Krankheit aufgestellt. Einige, z. B. Storch, hielten sie für die Folge einer Wachsthumstörung des Fleisches und der Knochen, hervorgerufen durch eine ungleiche Vertheilung der Nahrungssäfte. Andere (Portal) sahen in der Rachitis nur ein Symptom verschiedener, besonders dyskrasischer Krankheiten wie Syphilis, Skorbut, Scrofulose, Arthritis u. f. w., während wieder Andere sie für eine im Knochenysteme localisirte Scrofulose (Hufeland) oder für eine syphilitische Erkrankung (Boerhaave) hielten. Die meisten Anhänger hatte die schon von Glifson vertretene Anschauung, daß die Rachitis identisch sei mit der Osteomalacie, eine Ansicht, die noch von Troufseau, Bouchut, Hohl und Anderen vertheidigt wurde.

Erst in diesem Jahrhunderte wurde durch chemische Untersuchungen von Fourcroy, Schlofsberger, Friedländer u. f. w. und durch histiologische Forschungen von Koelliker, H. Meyer, Virchow, H. Mueller die Verschiedenheit der Rachitis, als einer Krankheit des wachsenden Knochens, und der Osteomalacie, als einer Krankheit des fertigen Knochens unzweifelhaft festgestellt.

Die Krankheit tritt fast immer in der Periode der I. Dentition auf, d. i. vom 4.—30. Lebensmonate. Höchst selten sind die Fälle, in denen die Rachitis bei der Geburt schon abgelaufen ist, — intrauterine Rachitis — oder nach der Geburt fortbesteht — congenitale Rachitis; wie dann auch die Krankheit nach dem 30. Lebensmonate

nur selten mehr vorkommt, um vom 5. Lebensjahre an fast ganz zu verschwinden. Doch wollen einige Forscher wie Glisson, Portal, Tripier Fälle von Rachitis beobachtet haben, welche erst nach der Pubertät entstanden sein sollen.

Die Krankheit, wiewohl auf der ganzen Erde vorkommend, tritt am häufigsten in Gegenden mit kälterem und feuchtem Klima auf, z. B. in Holland, England. Die gleich günstigen Verhältnisse für ihre Verbreitung findet die Rachitis auch in den dumpfen Wohnungen der ärmeren Volksklassen in Städten, wo in engen, dunklen und feuchten Kellerräumen oft viele Menschen womöglich noch mit einigen Hausthieren zusammen wohnen, und die Luft obendrein noch durch häusliche und gewerbliche Verrichtungen, wie Kochen, Waschen, Trocknen von Wäsche und dergl. verunreinigen, aus falscher Sparsamkeit im Winter das Lüften der Wohnräume unterlassen, vielmehr ängstlich jede Spalte an Fenstern und Thüren verschließen. Wenn man dazu noch die in diesen Klassen so ungemein häufig zu beobachtende Unreinlichkeit und den durch die Verhältnisse selbst gegebenen, schlechten Ernährungszustand der Leute in Anschlag bringt, so wird man das häufige Vorkommen der Rachitis bei den Kindern des Proletariates leicht begreiflich finden.

Befonders disponirt zur Rachitis sind Kinder, welche von Eltern stammen, die in ihrer Jugend selbst an Rachitis gelitten haben, wobei sich die Krankheit häufiger durch die Mütter, seltener durch die Väter vererbt, ferner Kinder von Eltern mit chronischer Tuberkulose, vor allem der Väter (Ritter von Rittershain) oder mit constitutioneller Syphilis (Boerhaave). Weiterhin wirken disponirend Blutarmuth, Säfteverlust, schlechter Ernährungszustand und vorgerücktes Alter der Eltern zur Zeit der Zeugung, — lauter Bedingungen, welche fast alle mehr bei den ärmeren Volkschichten als bei der wohlhabenden Bevölkerung gegeben sind und die den Ausbruch der Rachitis am meisten veranlassen.

Unter den Urfachen ist die hauptfächlichste eine fehlerhafte Ernährung, sei es daß die Mutterbrust zu kurze Zeit gereicht wird (J. L. Petit), oder daß das Stillen zu lange fortgesetzt wird (Zeviani), oder daß von vorneherein un zweckmäßige Nahrung gegeben wird, wie wir denn auch unter unseren Hausthieren am häufigsten den Ausbruch der Rachitis bei den Schweinen beobachten, die wohl am meisten zum Genuße von unzweckmäßiger Nahrung gelangen.

Die rachitischen Knochen zeigen schon makroskopisch groÙe Veränderungen: Die Epiphyßen der Röhrenknochen sind verdickt, weniger die Diaphyßen. Das Knochenmark, sowie das Periost mit den darunter gelegenen Schichten erscheint stark hyperämisch. Mikroskopisch sieht man eine bläulich weiÙe Wucherungsschicht, welche, normal 1 bis 2 mm dick, auf das 4—5 fache verstärkt ist — hyperplastische und hypertrophische Zone nach Strelzoff. Die darauf folgende grauweiÙe oder mattgelbe Verknöcherungsschicht, ebenfalls stärker entwickelt, hat ein siebartig durchbrochenes Aussehen — spongoides Gewebe nach Guérin, — und setzt sich auf einem Längsschnitte nicht in einer geraden Linie wie normal an die hypertrophische Zone an, sondern greift mit zackigen Vorsprüngen in dieselbe hinein, so daß man oft an Schnitten in der Wucherungszone Zapfen und Inseln verkalkten Gewebes findet. Das gleiche Verhalten zeigen auch die Markräume, welche unregelmäßig in die Wucherungsschicht hineinwachsen, ja selbst deren äußere Grenze erreichen, ohne daß in ihrem Umfange Verkalkung des Gewebes eintritt.

Das Periost der rachitischen Knochen ist bis zu mehreren Millimetern verdickt, blutreich und mit dem darunter liegenden Knochen stark adhärent, so daß beim gewaltfamen Abziehen desselben häufig Stücke porösen Knochengewebes mit abgerissen werden. Mikroskopisch zeigen sich in einiger Entfernung von der äußersten Peripherie die Bindegewebskörperchen

in starker Wucherung begriffen, die dann allmählig sich in Knochenkörperchen umwandeln — (Virchow). Auch hier findet mangelhafte Verkalkung statt mit Bildung weiter hyperämischer Markräume. Ueber beobachtete Unregelmäßigkeiten in der Anlage der Knochenbälkchen im spongiösen Knochengewebe und deren Einfluss auf die sich bei der Rachitis ausbildenden Deformationen liegen noch keine eingehenderen Arbeiten vor.

Bei Heilung der Rachitis tritt eine starke Verknöcherung der neugebildeten Knochenschichten ein, diese Partien verlieren ihr grobmaschiges Aussehen und an ihre Stelle tritt ein dichtes und schweres Knochengewebe — rachitische Sclerose, Eburneatio.

Das Wesen der Rachitis besteht nach Obigem in einer übermäßigen Bildung osteoiden Gewebes, d. h. Knochengrundsubstanz ohne die sonst mit ihr in gewissem Verhältnisse verbundene Knochenerde, während bei der Osteomalacie zuerst fertiges Knochengewebe durch die osteoklastischen Riesenellen zur Resorption kommt, worauf in die dadurch entstandenen Howship'schen Lacunen osteoides Gewebe, d. h. Gewebe ohne Erdsalze, apponirt wird.

Zur Entstehung der Rachitis gehören zwei Bedingungen, von welchen die eine die Wucherung der osteoiden Substanz, die andere die mangelhafte Verkalkung neugebildeten Gewebes herbeiführt.

Wegner gelang es, beiden Bedingungen zu genügen durch Fütterung mit Phosphor, der als Wachstumsreiz auf die knochenbildenden Gewebe wirkt, und durch gleichzeitige Entziehung der Kalksalze in der Nahrung, wodurch ächte Rachitis herbeigeführt worden sein soll. Gleiche Erfolge will Heitzmann durch Milchsäure-Fütterung neben Einschränkung der Kalkzufuhr erreicht haben.

Ähnliches Resultat hatte auch Baginsky (Virchow-Hirsch: Jahresbericht 1881, I.), der ebenfalls den Einfluss der

Entziehung des Kalkes in der Nahrung und der Fütterung mit Milchsäure auf den wachsenden Organismus an drei Hunden desselben Wurfes untersuchte, indem er denselben kalkarme Nahrung reichte, wobei aber Hund I dazu noch täglich 2 gr. Milchsäure, Hund II dagegen 2 gr. phosphorsauren Kalk erhielt. Nach einigen Monaten zeigte Hund II schlanke Knochen, Hund III aber makroskopisch und mikroskopisch rachitische Veränderungen des Skelettes, die noch stärker bei dem mit Milchsäure gefütterten Hund I ausgeprägt waren, woraus Baginsky den Schluss zieht, dass Entziehung der Kalksalze rachitische Veränderungen setzt, welche durch gleichzeitige Verabreichung von Milchsäure gesteigert werden.

Welche Bedeutung bei den zwei letzterwähnten Experimenten von Heitzmann und Baginsky die Milchsäure hatte, ist nicht bestimmt, jedenfalls hat sie nicht die Rolle einer die Salze des Knochens auflösenden Säure oder eines auf die knochenbildenden Gewebe wirkenden Wachstumsreizes gespielt, da nach einer im physiologischen Institute zu München von Dr. Heifs angestellten interessanten Untersuchung die Milchsäure zu schnell im lebenden Organismus zerlegt wird, als dass sie eine oben angegebene Wirkung äußern könnte.

Heifs fütterte nämlich durch 308 Tage hindurch ein 1½ Jahre altes, ausgewachsenes Wachtelhündchen bei kalkarmer Nahrung mit großen Dosen von Milchsäure, — es erhielt in der angegebenen Zeit 2286 gr. Milchsäure (fast die Hälfte seines eigenen Gewichtes), — ohne auch nur die geringste Spur von Veränderungen im Skelette zu finden oder im Harn nachweisen zu können.

Zugleich wurde durch dieses Experiment auf das Entschiedenste bewiesen, dass der ausgewachsene Körper nur sehr geringer Mengen von phosphorsauren alkalischen Erden in der Nahrung bedarf, um sich auf dem ungeschmälerten Bestande des Aschegehaltes der verschiedenen Organe zu erhalten.

Da die phosphorsauren, alkalischen Erden in neutralen

und alkalischen Flüssigkeiten nicht löslich sind, und also direkt in dem alkalischen Blute den Organen gelöst nicht zugeführt werden können, dieselben vielmehr höchst wahrscheinlich wie das Eisen an Eiweiß gebunden dem Körper einverleibt werden, so scheint mir die Wirkung der Milchsäure in den oben erwähnten Versuchen eine mehr zufällige, die Verdauungsvorgänge störende und die Fähigkeit des Eiweißes, sich mit phosphorsauren Salzen zu verbinden, hemmende oder beschränkende gewesen zu sein.

Somit bleibt von den Versuchen von Heitzmann und Baginsky als die die rachitischen Veränderungen veranlassende Ursache nur mehr die mangelhafte Zufuhr von phosphorsauren Salzen, wie dieses auch durch die Experimente und Beobachtungen von E. Voit, Lehmann, Roloff u. f. w. bestätigt wird.

Da der wachsende Organismus zum Aufbau des Skelettes bedeutend größerer Mengen von phosphorsauren Erden bedarf, als der Erwachsene zur Erhaltung seines Aschegehaltes, so wurde in den obigen Experimenten an jungen Thieren dem Körper eine zu geringe Quantität von Salzen einverleibt und dem Eiweiß zu wenig Gelegenheit geboten, solche chemisch gebunden in genügender Menge dem Organismus zuzuführen, wodurch eine unzulängliche Verkalkung des Skelettes veranlaßt wurde.

Ob nun aber eine die phosphorsauren Salze nur in ungenügender Menge führende Säftemischung zugleich auch den erhöhten Wachstumsreiz für die knochenbildenden Gewebe abgibt, oder ob noch andere, durch die obige Säftbeschaffenheit begünstigte oder veranlaßte, im Körper gebildete, unbekannte Produkte als Reiz für die Wucherung des osteoiden Gewebes angesehen werden müssen, vermag ich nicht zu entscheiden. Doch scheint mir hier mit Rücksicht auf die den Ausbruch der Krankheit begünstigenden Momente, wie Syphilis, Tuberkulose der Eltern u. f. w. eine anomale Säftemischung

allein schon der Reiz zu fein zur Wucherung des osteoiden Gewebes.

Da nun aber selbst bei der unzweckmäfsigsten Ernährung der Kinder und junger Thiere von zu geringer Kalkeinfuhr wie in den angeführten Experimenten kaum die Rede sein kann, weil selbst bei dieser Ernährung die Kalksalze noch in genügender Menge zugeführt werden, so müssen es andere Momente sein, welche eine ungenügende Aufnahme der Salze in den Säftestrom veranlassen. Hiefür müssen vor Allem die mit unserer Krankheit so ungemein häufig verbundenen, durch fehlerhafte Ernährung veranlafsten Digestionsstörungen verantwortlich gemacht werden, wobei vielleicht noch anormale Zeretzungsprodukte der Nahrung die Fähigkeit des Eiweisses, phosphorsaure alkalische Erden zu binden, herabstimmen. Ferner kommen in Betracht die durch die diarrhoischen Stühle zu raschen Entleerungen des Darmrohres (Klecinsky), wie denn auch Peterfen und Baginsky in den faeces rachitischer Kinder mehr Kalk fanden, als in denjenigen gesunder.

Die Rachitis schreitet nach Elsaefser entgegen den älteren, vor allem durch Guérin vertretenen Ansichten von oben nach unten fort. Sie beginnt durchschnittlich im 4. Lebensmonate am Schädel, der sich gegenüber dem normalen durch längeres Offenbleiben der Nähte, abnorme Gröfse und späteren Verschluss der vorderen Fontanelle, durch gröfsere Succulenz und Weichheit seiner Knochen, besonders gegen die Ränder hin, auszeichnet, was zu ihrer abnormen Biegsamkeit und Eindrückbarkeit Veranlassung gibt. Bei der in den ersten Lebensmonaten fast beständigen Rückenlage des Säuglings wird der hintere Abschnitt der Hirnkapsel durch den Druck des Gehirnes und den Gegendruck der äufseren Unterlage verdünnt, was bis zur vollständigen, mehrfachen Durchlöcherung führen kann, während der vom Gehirndrucke entlastete vordere Abschnitt der knöchernen Kapsel sogar üppig wuchern und eine Verdickung seiner Wandung erfahren kann. Erwähnte

Knochenlöcher, hervorgebracht durch die ufsirrende Wirkung der Gyri des pulfirenden Gehirnes, liegen immer in den zur sutura lambdoidea zusammenstossenden Knochenrändern — Craniotabes.

Ferner fällt sofort die im Verhältniss zum übrigen Körper bedeutende Gröfse des Kopfes auf, die breite, im Profile mächtig prominirende Stirne, sowie die stark nach Ausen geneigten Scheitelbeine. Nicht selten verläuft die sutura sagittalis, bisweilen auch die sutura coronaria gleichsam in einem Thale, welches von den verdickten Scheitelbeinen hügelartig begrenzt wird. (Henoch.)

Gleichfalls zu den primären Symptomen der Rachitis gehört die Kieferrachitis, welche nach Fleischmann nach Ablauf des ersten Lebensjahres nicht mehr zum Vorschein kommt, selbst wenn in einer späteren Periode die Rachitis in einem anderen Skelettheile auftreten sollte.

Die Parabel welche nach Muehlreiter — (Anatomie des menschlichen Gebisses: Leipzig 1870) die untere Zahnreihe normal beschreibt, wird durch den Zug des musculus geniohyoideus, durch welchen die unteren Schneidezähne frontal in eine Reihe gestellt werden, in der Weise verändert, dafs die Figur eines halben Sechseckes entsteht, dessen beide Ecken mit den Eckzähnen zusammenfallen. Diese Veränderung kann fogar soweit gehen, dafs die untere Schneidezahnreihe einen nach vorne concaven Bogen bildet — Schmid.

Ferner bewirkt der musculus masseter durch seinen Zug an dem weichen Unterkiefer eine Auswärtsdrehung des Unterkieferwinkels und zugleich in Verbindung mit dem musculus mylohyoideus eine Einwärtsneigung des Unterkieferalveolarrandes so dafs die Mahlfächen der Zähne der beiden Kiefer nicht mehr gehörig aufeinander passen, was noch durch krankhafte Auswärtsneigung des Oberkieferzahnfortsatzes vermehrt wird. Eine weitere Wirkung des musculus masseter im Vereine mit

dem pterygoideus internus ist eine Vergrößerung des Winkels, den der Unterkiefer mit seinen Aesten bildet.

Der Zahnfortsatz des Oberkiefers, welcher nach Mühlreiter eine halbe Ellipse darstellt, nimmt durch den rachitischen Prozeß eine mehr sphärische Gestalt an, wobei sich eine Einziehung des Alveolarfortsatzes zwischen dem 2. Backzahne und 1. Mahlzahne ausbildet. Nach meiner Ansicht ist diese Veränderung bedingt durch die Wachstumsdifferenz zwischen dem hinteren Abschnitt des processus palatinus, der seine hauptsächlichste Wachstumsbedingung in der Längsnaht zwischen beiden Oberkieferknochen findet, und zwischen dem vorderen Abschnitte, der zum Flächenwachstume günstigere Chancen hat in der beiderseitigen Verbindung des os incisivum mit dem Oberkieferknochen. Durch die eine Componente der Wachstumsrichtung in dieser Knochenverbindung wird der Zwischenkiefer nach vorne geschoben, dessen Zähne dadurch noch mehr außer Contact kommen mit den Schneidezähnen des durch den musculus geniohyoideus nach rückwärts gezogenen Mittelfstückes des Unterkiefers, während durch die andere Componente der vordere Abschnitt des processus palatinus nach aussen gedrängt wird, und da nach meiner Meinung durch den Gegendruck des processus zygomaticus in der Gegend zwischen dem 2. Backzahne und 1. Mahlzahne ein Drehpunkt gegeben ist, eine Rotation nach außen und hinten macht, wodurch die dem rachitischen Oberkiefer eigenthümliche Gestaltsveränderung sich nach mechanischen Prinzipien erklären ließe.

Die Zähne, deren verzögerter Ausbruch bei Rachitis schon längst bekannt ist, nehmen wegen der theils durch die rachitische Kieferdeformation, theils durch das der Zeit und Reihenfolge nach regelwidrige Ausbrechen gesetzten räumlichen Mißverhältnisse abnorme Stellungen an. Die Zähne bleiben nach Ritter von Rittershain (die Pathologie und Therapie der Rachitis, Berlin 1863) im Wachstume zurück, der Schmelz

ist dünn oder fehlt zuweilen ganz, wodurch die Zähne schwarz werden und zerbröckeln. Ueber besondere rachitische Zahnveränderungen (Schmelzfalten), worauf Schmid aufmerksam macht, existieren nach meinem Wissen keine eingehendere Arbeiten.

Auch an den übrigen Theilen des Skelettes setzt die Rachitis Veränderungen, die für den praktischen Arzt von ungleich höherem Interesse sind als die Rachitis des Schädels.

Der Thorax wird bei der Inspiration durch den Atmosphärendruck von der Seite zusammengedrückt; die Rippen, welche sehr häufig Infractionen und Frakturen durch Muskelzug oder äußere Gewalten erleiden, sind an ihren vorderen Enden aufgetrieben (rachitischer Rosenkranz) und setzen sich gegen die Rippenknorpel mehr stumpfwinkelig ab, statt im Bogen in dieselben überzugehen (Hueter); das Sternum wölbt sich nach vorne, (*pectus carinatum*), der hintere Theil der unteren Rippen wölbt sich auswärts nach hinten, so daß sie das Niveau der Wirbel bedeutend überragen. Entweder gleichzeitig oder später treten einige Wirbel hervor und zwar die untersten Rückenwirbel und obersten Lendenwirbel.

Diese Veränderungen des Thorax scheinen mir meistens veranlaßt zu sein durch die häufigen Expirationsstöße bei den mit der Rachitis so ungemein häufig verbundenen Affectionen der Luftwege, wobei die weiche Thoraxwand nach vorne ausweicht, während die Seitenwand durch den Druck der Arme beim Liegen und bei der aufrechten Haltung des Körpers am Ausweichen verhindert wird und sogar in Verbindung mit der Wirkung der Expirationsmuskeln eingedrückt wird.

Die Verkrümmung der Wirbelsäule ist veranlaßt durch Anomalien des Höhenwachstums der Wirbelkörper, welche bei der fast immer vorhandenen Schlaffheit der Muskulatur, in specie der Rückenmuskulatur, und bei dem daraus fol-

genden Vorneüberhängen des Thorax, wozu noch besonders der Zug der Expirationsmuskulatur der Bauchpresse (rectus abdominis) mitwirken kann, an ihrem vorderen Abschnitte einem stärkeren Drucke ausgesetzt sind, wodurch entweder eine Resorption an dieser Stelle stattfindet, oder wenigstens ein geringerer Ansetz von wucherndem Knorpelgewebe ermöglicht ist als an dem weniger belasteten hintern Abschnitte der Wirbelkörper. Je nach Modifikation dieser Druckdifferenzen, bedingt zum Theil durch vorwiegenden Gebrauch einer obern Extremität von Seite des Kindes, zum Theil durch fortwährendes Tragen des Kindes auf dem gleichen Arme der Pflgerin, an welche das Kind sich anschmiegt, entstehen verschiedene Formen der Rückgratverkrümmung.

Ob diese Veränderungen des Thorax überhaupt und speziell in solch hohem Grade auch bei den nicht mit Affectionen der Luftwege complicirten Fällen der Rachitis vorzukommen pflegen, darüber habe ich in der Literatur nichts gefunden.

Von größter Wichtigkeit sind die Veränderungen, die das Becken durch unsere Krankheit erfährt. Durch die Rumpflast wird das Kreuzbein beim Sitzen und Stehen in das kleine Becken hineingetrieben, dessen vordere Fläche durch Vordrängen seiner Wirbelkörper sogar von rechts nach links convex werden kann, und dessen Seitentheile sich nur sehr schwach entwickeln. Zugleich macht das Kreuzbein eine Rotation um seine frontale Axe, wodurch der untere Theil mehr nach hinten zurückweichen müßte, während das promontorium sich der Symphyse nähert. Da aber der untere Theil des os sacrum durch starke Bänder mit den Beckenknochen verbunden ist, so wird durch oben erwähnte Achsendrehung der untere Abschnitt des Kreuzbeins hackenförmig gegen den oberen abgesetzt, wodurch die Concavität von oben nach unten bedeutend vermehrt wird.

Da nun das Kreuzbein an seinen oberen Theilen durch die symphysis sacroiliaca und deren kräftige Verstärkungs-

bänder sehr fest mit dem Darmbeine verbunden ist, so wirkt die Rumpflast zugleich auch am hinteren Abschnitt des Darmbeines als ein nach vorne und innen gerichteter Zug. Die hinteren Enden der Darmbeine nähern sich dadurch einander, und das ganze Becken erleidet eine starke Querspannung. Da aber ein Auseinanderweichen der beiden Beckenknochen vorne wegen der starken Symphysenverbindung nicht möglich ist, so tritt zwischen dem hinteren und vorderen Abschnitt jedes Beckenknochens eine Einknickung ein, die noch vermehrt wird durch den Druck der Schenkelknochen, deren Pfannen bei dieser Gestaltsveränderung mehr auf die vordere Beckenwand zu liegen gekommen sind.

Durch das Hineinsinken des Kreuzbeines in das kleine Becken und den Druck der Schenkelknochen wird die conjugata vera des rachitischen Beckens sehr verkleinert, während der Querdurchmesser selbst normal bleibt, ja sogar eine Vergrößerung erfahren kann.

Den höchsten Grad von Difformität erleiden die Knochen der Extremitäten. Als erste Erscheinung der Rachitis an den Extremitäten fällt das Anschwellen der Epiphysen auf, das auch Veranlassung zu dem Namen: »Doppelte Glieder«, »Zwiewuchs« wurde.

Durch Muskelaktion und den Druck der zu tragenden Last werden die Epiphysen gegen die Diaphysen verschoben und eingeknickt, die weichen Knochen verbogen, selbst geknickt, einer Federspule ähnlich, wie sich Virchow ausdrückt, indem an der convexen Seite des eingeknickten Knochens dieser selbst und sein Periost intakt bleiben, während an der entgegengesetzten Seite die geknickte Knochenstelle in die Markhöhle vorragt und diese selbst vollständig verschließen kann. Seltener kommen wegen der Weichheit der Knochen Frakturen vor.

Erwähnte Verkrümmungen und Infraktionen kommen am häufigsten an den Knochen des Vorderarmes und Unterschen-

kels vor. An der oberen Extremität sind sie abgesehen von dem Muskelzuge und äußerer Gewalt bedingt durch den Druck des Oberkörpers auf die beim Kriechen auf allen Vieren und beim Rutschen der Kinder gegen den Boden gestemmtten Arme. Während der Oberschenkelknochen gewöhnlich in seiner Mitte nach innen und vorne eingeknickt wird, findet sich die Knickungsstelle am Unterschenkel fast immer zwischen dem 1. und 2. Drittel desselben mit der Convexität nach aussen und vorne gerichtet. Ferner bewirkt der rachitische Process wie bei den Wirbelkörpern durch den stärkeren Druck der zu tragenden Last an der einen Stelle der zu einem Gelenke zusammenstossenden Knochenenden Resorption und Tabescenz oder wenigstens verminderten Gewebsansatz, während an den weniger gedrückten Stellen Wucherung und vermehrter Ansatz von Knochengewebe ermöglicht ist — Ursache von genu valgum, pes planus u. f. w.

Durch die angeführten Veränderungen an der Wirbelsäule, dem Becken und den unteren Extremitäten erleidet das rachitische Skelett eine beträchtliche Einbuss im Höhenwachstume.

Auf die übrigen, bei der Rachitis vorkommenden Krankheitsercheinungen unterlasse ich hier einzugehen als nicht zu dem zu schildernden speziellen Falle gehörig und wende mich nun zur Beschreibung des durch die grosse Güte des Herrn Professors Dr. Bollinger mir zur Verfügung gestellten Skelettes, das von einem in der Strafanstalt zu Laufen verstorbenen 41 jährigen Sträflinge (geboren im Kreise Schwaben und Neuburg) herrührt. Die Leiche selbst wurde von Herrn Professor Rüdinger dem Pathologischen Institute zur weiteren Verwerthung überwiesen.

Schädelknochen.

Os occipitis. Die untere Fläche der *pars basilaris* befindet sich so ziemlich im gleichen Niveau mit der Umrandung des *foramen magnum*. Vor dem großen Hinterhauptloche und den Gelenkflächen findet sich eine frontal verlaufende Furche, die noch an ihrem vorderen Rande durch je einen seitwärts von der Mittellinie vorstehenden Knochenhöcker, — Ansatz des *musculus rectus capitis articus minor*, vertieft wird. Das *tuberculum pharyngeum* ist kaum angedeutet. Die Gelenkflächen der *partes condyloideae* bestehen aus je zwei Facetten, die zu einer Kante zusammenstoßen. Der innere Rand ragt höckerig gegen das *foramen magnum* vor und verringert dadurch von den Seiten her das an sich schon enge Hinterhauptloch in seiner vorderen Hälfte. Hinten und seitwärts von den Gelenkflächen finden sich grubige Spalten, wodurch die Schuppe von der *pars condyloidea* scharf abgesetzt erscheint (*Infraction*).

Der untere Theil der Schuppe ist weniger schalenförmig, sondern mehr plan mit deutlich ausgesprochenen Muskelansätzen. Die hinteren Schädelgruben sind transparent, groß und flach; die sehr verbreiterte *protuberantia externa* erscheint von unten her wie eingefeilt — Ansatz des *ligamentum nuchae*.

Das Hinterhauptbein erscheint mit Ausschluss der oberen Hälfte der Schuppe von vorne nach hinten nur wenig convex, von rechts nach links sogar concav an seiner unteren Fläche. Der obere Theil der Schuppe ist trotz seiner beträchtlichen Höhe klein, da der *margo lambdoid.* beiderseits stark convex ist.

Os sphenoidum. Der *clivus Blumenbachii* ist uneben und rauh, der Winkel, den normal der Clivus mit der oberen Fläche des Keilbeinkörpers einschließt, ist hier viel stumpfer und beträgt fast 180° . Die *ligula* ist groß. Die obere Fläche der sehr in die Breite gezogenen *alae parvae* zeigt viele frontal verlaufende, feine Fältchen und ist sehr transparent. Vom unteren Segment des vorderen Randes der *ala magna* geht

ein breites, scharfes Knochenblatt nach unten und hinten. Die ala magna selbst ist stellenweise transparent.

Die lamina externa des processus pterygoideus ist rechts mit ihrem unteren Theile stark nach ausen gezogen — eine Wirkung des musculus pterygoideus externus; die lamina interna, wie die äussere transparent, ist nach hinten verbreitert, wodurch die fossa pterygoidea tiefer erscheint.

Os frontis. Gesichtswand ist durchscheinend; links und rechts von der Mittellinie gegen die Kronennaht zu ist der Knochen verdickt und ebenso seine pars orbitaria, die tubera wenig entwickelt, die glabella ist breit, der margo supraorbitalis dick; beiderseits befindet sich ein foramen supraorbitale.

Os ethmoideum. Die lamina cribrosa ist breit, sehr stark transparent und trägt sehr unregelmässige foramina.

Os parietale ist dick und hat nur rechts ein kleines foramen parietale im angulus lambdoideus.

Os temporum. Die kleine und transparente Schuppe ist mit ihrer äusseren Fläche nach ausen und unten geneigt. Processus mastoideus ist aufgetrieben und plump; processus zygomaticus und styloideus sind lang. Die lange pars petrosa ist ihrer Richtung nach mehr frontal, die verlängerten Längsaxen beider schneiden sich nicht in der Mitte des Türkenfäuels, sondern im clivus Blumenbachii. Der nach hinten breit vorstehende processus jugularis dexter vertieft die an sich schon tiefe fossa sigmoidea noch mehr. Der hiatus canalis Fallop. ist rechts weit. In der sutura lambdoidea zählt man 23 grössere Schaltknochen. Die sutura sagittalis ist am hinteren Ende fast verstrichen. In der sutura coronaria finden sich 4 grosse ossa intercalaria, zwischen os parietale und os temporum links 13, rechts 6 ossa Wormiana.

Gesichtsknochen.

Os maxillare superius. Die Wände des Körpers sind sehr dünn und stark transparent wie Stearinpapier, besonders die Gesichtswand, welche trotz der fehlenden Alveolen sehr

tief concav erscheint. Der stark verbreiterte processus frontalis macht in Verbindung mit den kräftig entwickelten Nasenbeinen das knöcherne Dach über der vorderen Nasenapertur stark hervorspringend. Der processus zygomaticus stößt breit an das in allen Einzelheiten stark entwickelte Jochbein, welches in der Richtung nach hinten und oben gegen die Schläfengegend hin verschmälert und in der darauf senkrechten Richtung verbreitert erscheint.

Der processus palatinus ist transparent, die Mundfläche höckerig und rauh; gegen den processus alveolaris hin verläuft eine, besonders links tiefe, sagittale Furche. Die processus alveolares tragen noch: rechts den ersten Mahlzahn, links den ersten und zweiten Schneidezahn, den Eck- und ersten Mahlzahn. Der erste Backzahn und der zweite Mahlzahn scheinen bei der Maceration ausgebrochen zu sein; der erste und zweite Backzahn rechts und der zweite Backzahn links dürften schon länger fehlen, während der rechte, zweite Mahlzahn und die beiden Weisheitszähne nicht zum Ausbruch gekommen zu sein scheinen.

Die Zähne, besonders ihre colla, sind schmutzig, braunschwarz gefärbt, der erste, linke Mahlzahn ist stark cariös. Die äußere, labiale Wand des Alveolarfortsatzes erscheint über den vorderen noch stehenden Zähnen äußerst dünn, die Wurzeln derselben kaum bis zur Hälfte deckend. Die Alveolen für den ersten Mahlzahn sind beiderseits zum großen Theile zerstört.

Der Verbindung der beiden Unterkieferknochen entsprechend läuft ein scharfrandiger, concav ausgeschnittener, bis zu $\frac{3}{4}$ cm hoher Knochengrat von der stark vorspringenden spina nasalis anterior bis zum vorderen Rand des processus alveolaris herab. Vor dem ersten Mahlzahn ist eine leichte Einziehung des Alveolarfortsatzes. Der die Schneidezähne tragende Theil des processus alveolaris ist lang entwickelt, schief nach vorne und unten ragend.

Der freie Rand der apertura pyriformis narium ist scharf, verbreitert, wodurch die Apertur selbst schmaler und in ihren Umrissen mehr lanzettförmig wird.

Os palatinum ist in allen Theilen durchscheinend dünn; die Choanen sind weniger breit wie normal.

Os lacrymale ist äußerst dünn, mit kleinen Durchbrechungen des Knochens.

Nasenscheidewand ist in der oberen Hälfte stark nach rechts, in der unteren stark nach links convex.

Os maxillare inferius trägt in seinem processus alveolaris noch folgende Zähne: Eckzahn, erster und zweiter Backzahn rechts, Eckzahn und zweiter Backzahn links, welche sämmtliche wie im Oberkiefer schmutzig braunschwarz gefärbt sind. Die übrigen Zähne dürften schon längere Zeit fehlen.

Der untere Rand des die Schneidezähne tragenden Mittelstückes des Unterkiefers erscheint nach vorne aufgekrempt, entsprechend dem Anfätze des depressor anguli oris und depressor labii inferioris. Der Unterkiefer ist besonders links, dem musculus masseter entsprechend, nach außen etwas umgelegt. Die linea mylohyoidea ist stark entwickelt.

Die normal parabolische Gestalt des Unterkiefers erscheint durch Streckung und Frontalstellung des normaler Weise gebogenen, den Schneidezähnen entsprechenden Mittelstückes verändert. Der untere Kieferrand ist schmal, wodurch die linea obliqua interna von unten gesehen noch stärker prominierend erscheint, die spina mentalis interna ist gut entwickelt. Der processus coronoideus des hohen aufsteigenden Astes ist sehr lang und normal gerichtet, wodurch die incisura semilunaris sehr groß erscheint. Die Spitze des processus coronoideus ist links 0.5 cm von der Naht zwischen Schuppe und großem Keilbeinflügel, rechts ungefähr 1 cm davon entfernt. Der hintere Rand des Unterkieferastes, welcher entsprechend dem Anfätze des musculus pterygoideus internus dicker, links zudem noch mit einer fast 0.5 cm. langen, spitzen, knöchernen

Zacke verfehen erscheint, ist wie auch der hintere Rand des frontal dünnen, aber nach vorne und hinten verbreiterten Collum des processus condyloideus, von hinten her nach einwärts gebogen, wodurch in Vereinigung mit der langen und breiten lingula eine breite, tiefe Furche gebildet wird, die zum Eingang in den weiten Unterkieferkanal führt. Das Capitulum ist in der Längenaxe vergrößert, welche hier mehr frontal verläuft, wie normal. Der angulus maxillae inferioris ist vergrößert.

Wirbelsäule.

Halssegment. Das tuberculum posticum Atlantis ist stark entwickelt. Zur Gelenkverbindung mit dem Kopfe besitzt der Atlas beiderseits zwei überknorpelte Flächen, die unter einem stumpfen Winkel zusammenstoßen, zur Aufnahme des entsprechenden, überknorpelten Firtes an der pars condyloidea des Hinterhauptbeines. Die processus spinosi des 2. und 3. Halswirbels sind kräftig entwickelt und auch unten in zwei breite Knochenblätter auslaufend. Der processus spinosus des 7. Halswirbels ist sehr stark prominierend.

Brustsegment. Die Wirbelkörper sind unregelmäßig abwechselnd, bald auf der rechten, bald auf der linken Seite höher. Die Abweichung dieses Segmentes nach rechts ist gering, an den Dornfortsätzen betrachtet. Die processus spinosi, stark entwickelt, sind im oberen Drittel mehr horizontal, im mittleren sich nicht so sehr wie normal dachziegelförmig deckend, im unteren Drittel fast horizontal.

Lendensegment. Die Abweichung ist nach den processus spinosi genommen eine geringe nach links. Die Höhen der Wirbelkörper auf beiden Seiten unregelmäßig abwechselnd verschieden, der 2., 4. und 5. processus spinosus sehr kräftig entwickelt.

Kreuzbein ist sehr klein und nach vorne sehr stark concav. Die Kreuzbeinwirbelkörper sind schmal und niedrig, die Synostosen stark hervorspringend, so daß die Körper von

oben nach unten ausgehöhlt, und von rechts nach links rinnenförmig vertieft erscheinen. Der untere Abschnitt des os sacrum — 4. und 5. Wirbel — ist gegen den oberen, fast horizontal nach hinten verlaufenden Abschnitt in einem rechten Winkel nach vorne abgebogen. Die foramina sacralia anteriora sind kleiner wie normal, besonders das vierte. Der obere Abschnitt des os sacrum ist von rechts nach links stark concav nach vorne.

Die massae laterales sind, soweit sie der Ausdehnung nach der facies auricularis entsprechen, sehr schmal, so daß der untere Abschnitt der Seitentheile ebenso breit erscheint wie der obere — natürlich von vorne gesehen. Die stark abgerundete Knochenkante an den massae laterales zwischen der vorderen Fläche und der Basis verläuft nicht steil zum promontorium, sondern zur Mitte des ersten Kreuzbeinwirbelkörpers, so daß das promontorium nicht in der Ebene der linea terminalis, sondern über derselben liegt. Die crista media der hinteren Fläche, den ersten drei Kreuzbeinwirbeln entsprechend, ist zu deutlichen Dornfortsätzen entwickelt, deren erster mehr denn 2.5 cm lang ist. Die foramina sacralia posteriora sind sehr klein, die massae laterales nach hinten im unteren Abschnitt kräftig entwickelt, dick und knorrig.

Steißbein: Der erste Steißbeinwirbelkörper ist mit dem Kreuzbeine verwachsen, das cornu sacrale und cornu coccygeum sind rechts knöchern, links fibrös verbunden. Zwischen dem ersten und zweiten Steißbeinwirbel findet sich eine knorpelige Verbindung; das Uebrige ist normal.

Brustkorb.

Rippen. Die knöchernen Rippen, im Ganzen schon massiger erscheinend, sind am capitulum und Sternalende breiter und dicker. Labium externum sulci costae erscheint verbreitert, stellenweise unregelmäßig eingekerbt, die Intercosträume, besonders an den Seiten gegen den angulus costae hin,

sind dadurch sehr stark verengt. Im Sternalende der ersten Rippe finden sich mehrfache Fracturen; in vorderen Drittel der dritten Rippe links ist eine schief nach innen und aussen verlaufende Fractur.

Rippenknorpel sind besonders an den falschen Rippen sehr breit.

Sternum liegt nicht genau in der Medianlinie des Körpers, sondern ist etwas nach links abgewichen. Das sehr breite manubrium sterni ist gegen das corpus sterni stumpfwinkelig abgesetzt. Die incisurae claviculares sind nicht weit von einander entfernt, die incisura jugularis ist in frontaler Richtung kurz. Das corpus sterni ist an den Ansatzstellen der Rippenknorpel verdickt. In der Höhe des Ansatzes des 5. und 6. Rippenknorpels befinden sich Infracturen und grubige Einziehungen der untern Hälfte des Brustbeines und des knorpeligen processus xiphoideus sammt den entsprechenden Rippenknorpeln, wodurch diese gegen das Sternalende der Rippen stumpfwinkelig abgesetzt sind.

Schultergürtel.

Clavicula. Beide sind schlank und mehr gestreckt; an der extremitas acromialis links findet sich eine Fraktur.

Scapula. Beide Schulterblätter sind groß, sehr stark transparent, selbst mit einigen kleinen, durchbrochenen Stellen, und an den Rändern nur wenig verdickt. Die processus coracoidei sind kurz, breit und nach vorne stark abwärts geneigt, die Colla kurz. Die cavitates glenoidales haben aufgeworfene und verdickte Ränder. Die leicht convexen Gelenkflächen zeigen einige flache Gruben. Am oberen Rande der rechten cavitas glenoidalis befindet sich eine ungefähr 2 cm. lange, 4 mm tiefe, klaffende Spalte, ebenso links, nur weniger tief — Infracturen.

Rechte obere Extremität.

Humerus ist auf die Hälfte verkürzt; die obere Ge-

lenkfläche ist leicht concav, uneben und steht ziemlich steil, die Ränder der Gelenkfläche sind dick und aufgetrieben, so daß das obere Humerusende pilzförmig erscheint. Die beiden tubercula und damit der sulcus intertubercularis sind nur schlecht zum Ausdrücke gebracht. Die normalen Krümmungen der Diaphyse sind an dem verkürzten humerus sehr stark ausgesprochen. Die äussere Kante des Mittelfstückes ist bis zu dem aufgetriebenen condylus externus herab stark entwickelt. Der condylus internus ist zipfelförmig nach Oben entwickelt und verlängert. Die äussere Hälfte der trochlea und die eminentia capitata sind zu einem dicken Knorren verwachsen, auf dem der Radius artikuliert. Die fossa supratrochlearis anterior ist nur schwach angedeutet, die fossa supratrochlearis posterior ist klein, aber tief.

Ulna: Die schlanke, gegen das obere Ende etwas verdickte ulna trägt ein kräftig entwickeltes olecranon. Die äussere Facette der oberen Gelenkfläche ist sehr klein. An dem schwach entwickelten unteren Ende ist der processus styloideus ebenfalls klein.

Radius: Durch den aufgetriebenen Gelenkrand erscheint das capitulum pilzförmig. Die crista ist scharf und breit, der processus styloideus fehlt.

Carpus: Sämtliche Knochen sind klein, sehr porotisch und ziemlich regelwidrig gestaltet. Die Handwurzelknochen sind fast in einer Ebene aneinander gereiht, nur der Hacken des os hamatum ragt etwas in die vola manus hervor. Zwischen os multangulum, minus, os capitatum und der ersten Handwurzelknochenreihe, sind 2 überzählige Knöchelchen, so daß dieser carpus aus 10 Knochen besteht.

Metacarpus ist wenig gewölbt; die capitula etwas aufgetrieben.

Digit: bases und capitula der ersten und zweiten Phalangenreihe sind etwas aufgetrieben, Ulnar- und Radialrand

des Mittelstückes der ersten Phalangenreihe sind schärfer entwickelt und volarwärts etwas eingebogen.

Linke obere Extremität.

Humerus. Das obere Ende gleicht dem des rechten humerus, nur die Gelenkfläche ist noch steiler, fast vertikal stehend. Das Mittelstück erscheint dem collum chirurgicum entsprechend seitlich comprimirt; an der inneren Seite und unter dem unteren Rande der Gelenkfläche verläuft eine tiefe, aufwärts gerichtete klaffende Spalte bis zur Hälfte des vorderen und hinteren Umfanges des GelenkranDES emporsteigend. — **Infraction.** Die trochlea ist gut entwickelt, condylus internus, wie rechts, condylus externus mit eminentia capitata knorrig aufgetrieben. Die fossa supratrochlearis anterior ist kaum angedeutet, die posterior klein aber tief.

Ulna und Radius: wie an der rechten oberen Extremität.

Carpus: die kleinen und regelwidrig geformten Knochen sind fast in einer Ebene aneinander gereiht. Os lunatum und os capitatum sind verwachsen, das os pisiforme fehlt; os triquetrum läuft gegen die vola manus in einen spitzen Zipf aus, welcher vielleicht als das mit den os triquetrum verwachsene os pisiforme gedeutet werden dürfte. Das dorsalwärts gedrängte os multangulum minus trägt an seiner Volarfläche zwischen os naviculare, os capitatum und os multangulum majus einen überzähligen Knochen, so daß der Carpus, wenn man das verwachsene os lunatum als selbstständig rechnet, trotz des fehlenden os pisiforme aus acht Knochen besteht.

Metacarpus und digiti: wie an der rechten oberen Extremität.

Becken.

Os coxae sinistrum: Die Darmbeinschaukel ist in ihrem vorderen Theile kleinhandtellergröÙ, stark transparent und stark ausgehöhlt. Die spina anterior inferior ist gering entwickelt, die spina ossis ischii lang, breit und dünn, wodurch

die incisura ischiadica major tiefer, ihr Radius also kleiner wird wie normal. Die tuberositas ossis ischii ist stark nach aufsen gewendet und dem Anfätze des ligamentum tuberoso-sacrum entsprechend scharfrandig. Der untere Rand des ramus ascendens ossis ischii und ramus descendens ossis pubis ist stark nach Aufsen umgelegt. Die Kante des horizontalen Schambeinaftes ist sehr scharf.

Dort wo die drei Stücke des Hüftbeines zusammenstossen, ist der Knochen mässig entwickelt; das acetabulum wird aus den Ebenen des Knochens stark nach Aufsen gedrängt, so dafs es, etwas eingeschnürt, wie auf einem Halbe sitzend erscheint; das kleine, nur mässig concave acetabulum wird durch die nach vorne und innen fehlende incisura acetabuli bohnenförmig und ist von dicken Rändern umgeben. Vom hintern Umfange des acetabulum quer durch die Gelenkfläche bis fast zur incisura acetabuli verläuft eine mehrere Millimeter tiefe und mehr als 1 mm breite, klaffende Spalte — Infractio. Von der incisura acetabuli erstreckt sich gegen das foramen obturatorium eine bis fast 2 cm tiefe Furche, welche von der vorderen äufseren Kante des horizontalen Schambeinaftes gewölbartig überragt wird. Der spitze Pol des eiförmigen foramen obturatorium ist fast nach unten gerichtet.

Os coxae dextrum. Auf dem vorderen Abschnitte der äufseren Fläche der Darmbeinschaukel befindet sich, 1 cm von der spina anterior inferior entfernt beginnend und nahezu parallel mit der crista ossis ilii verlaufend, eine hahnenkammähnliche Exostose von ungefähr 4 cm Länge und bis zu 1 cm Höhe; das übrige wie links. Die spina ossis ischii ist weniger lang aber breiter wie links; die tuberositas ossis ischii ist hier noch mehr wie auf der linken Seite um eine vertikale Axe nach Aufsen gedreht. Die Kante des horizontalen Schambeinaftes ist noch schärfer wie links. Das foramen obturatorium gleicht mehr einem Dreiecke mit abgerundeten Winkeln. Das acetabulum verhält sich im Allgemeinen wie das des

linken Hüftbeines, nur ist es etwas tiefer; auch hier ist die incisura acetabuli nach vorne und innen gerichtet. Von ihrem unteren Rande verlaufen quer bis über die Mitte der Gelenkflächen ziehend wellenförmig zwei einander fast parallele, mehr wie 5 mm tiefe und bis zu 2 mm klaffende Spalten, eine dritte Spalte ungefähr 2 cm lang und mehr als 1 cm tief, zieht, über der incisura acetabuli beginnend, parallel dem vorderen Umfange der Gelenkfläche nach oben; diese Spalte erscheint in der Tiefe transparent. — Infracrurionen. Von der incisura acetabuli zieht ebenfalls gegen das foramen obturatorium eine horizontale Furche, welche durch den überhängenden, vorderen, äufseren Rand des horizontalen Schambeinaftes in eine über 2 cm tiefe Nische verwandelt wird.

Linke untere Extremität.

Femur: der Gelenkkopf des sehr verkürzten Oberschenkels sitzt pilzförmig auf einem kurzen, seitlich comprimirt erscheinenden collum auf. Die Gelenkfläche ist weniger convex, uneben und in sagittaler Richtung gröfser wie in frontaler, der trochanter major und minor sind knorrig und mäfsig grofs, die fossa trochanterica schmal und tief; fast rings um den äufsern und hintern Umfang des collum verläuft an seinem Ansatz an das Mittelstück eine tiefe klaffende Spalte. — Infracrurion. Ueber der linea intertrochanterica entsteht durch das Ueberhängen des inneren Gelenkrandes eine tiefe, zum hinteren Umfange des Halses verlaufende Rinne.

Die Diaphyse des Oberschenkels erscheint ungefähr in ihrer Mitte nach innen und hinten in einem Winkel von ungefähr 120° geknickt, der Knochen selbst in der Richtung der Knickungsaxe comprimirt, in der Winkalebene sitzt von der Diaphyse durch eine ganz feichte Längsfurche beiderseits abgesetzt, ein ungefähr 10 cm langes und 1,5 cm Durchmesser haltendes Stück Knochen, das, wahrscheinlich von einem Splitterbruche herrührend, seiner ganzen Länge nach, in der Win-

kelebene mit der gebrochenen Diaphyse verwachsen ist. — Fraktur.

Die Ränder der Gelenkfläche und die Condylen sind knorrig verdickt und pilzartig aufgeworfen. Die Kniescheibe artikuliert auf einer Gelenkfläche, welche dem femur wie auf einem collum aufsitzt. Die vordere Hälfte der Gelenkfläche der Condylen, welche beide gleich hoch stehen, ist fast ganz plan, die fossa intercondyloidea ist unregelmässig, medialwärts verzerrt.

Tibia: Die Gelenkränder sind pilzförmig aufgetrieben und die Gelenkfläche dadurch vergrößert. In der Mitte zwischen eminentia intercondyloidea und condylus externus verläuft sagittal eine tiefe klaffende Spalte fast durch die ganze Gelenkfläche, die spina tibiae ist fast bis zur Höhe der Gelenkfläche gerückt und vom Gelenkrande nur durch eine schmale, grubig vertiefte Furche getrennt. Das Mittelfstück der tibia ist schlank, ihr unteres Ende gegen den malleolus internus aufgetrieben.

Fibula: Die schlanke fibula ist im Verhältniß zur tibia zu lang; das ganze Köpfchen ragt über das Niveau der Kniegelenkfläche der tibia hinaus.

Tarsus: Die Tarsusknochen erscheinen in frontaler Richtung breiter, in sagittaler kürzer und sind mehr plump.

Metatarsus: bases und capitula der Metatarsalknochen und ersten Phalangen sind etwas verdickt. Der Fuß, pes planus, ist am inneren Rande stark convex.

Rechte untere Extremität.

Femur: Die obere Gelenkfläche ist etwas mehr wie links convex, in frontaler Richtung größer wie in sagittaler. Der Hals ist kurz, die fossa trochanterica feicht und in eine tiefe, enge Spalte sich fortsetzend, welche am äußeren und hinteren Umfange des collum, entsprechend seinem Ansatz an das Mittelfstück, herumläuft. — Infraction. Der condylus externus ist schwach entwickelt, an seinem äußern und fast ganzen hinte-

ren Umfange verläuft eine mäfsig ausgehöhlte Rinne. — Infraction. Der fehr mächtig entwickelte condylus internus ragt mehr wie 4 cm weiter nach unten, wie der externus. Dem entsprechend verläuft die Ebene der unregelmäfsig gestalteten incisura intercondyloidea nach Innen zu in einem spitzen Winkel zur Axe des Oberschenkels.

Tibia. Die Kniegelenkränder find besonders hinten zu aufgetrieben und überhängend, die Kniegelenkflächen fchief nach hinten abfallend. Der condylus internus läuft in einen dicken Knochenzapfen aus; feine Gelenkfläche fteht bedeutend tiefer wie die des condylus externus, welche ziemlich normal ift. Zwischen condylus internus und eminentia intercondyloidea verläuft fagittal eine tiefe, bis zu 5 mm klaffende Spalte. — Infraction. Das Uebrige verhält fich wie links.

Fibula zeigt keine befonderen Eigenthümlichkeiten.

Tarsus, Metatarsus und Phalangen verhalten fich wie die der linken Extremität. Der Fußbogen ift erhalten, der innere Fußrand nach einwärts convex, doch weniger wie links.

Zur befferen Ueberficht der eigenthümlichen Mafsverhältniffe bezüglich des Längenwachsthums füge ich fie hier im Zusammenhange an mit Gegenüberftellung der Mafsverhältniffe eines normalen Skelettes, welches fich in der Münchener anatomifchen Sammlung befindet.

Masse des Kopfes.

Umfang des Kopfes	59.0 cm.
Querdurchmeffer	17.0 „
Längsdurchmeffer	19.4 „
Höhendurchmeffer zum vordern Rande des foramen magnum . . .	12.4 „
Profilwinkel	87°
Gerade Entfernung (von der Nafenwurzel bis Alveolarrand des	
Oberkiefers)	6.9 cm.
Nafenwinkel	84°

Gerade Entfernung (von der Nasenwurzel bis spina nas. ant.) . . .	5.2 cm.
Alveolarwinkel	78°
Gerade Entfernung (von der spina nas. ant. bis Alveolarrand des Oberkiefer)	1.7 cm.
Capacitæet: 1820 ccm.	

Tabelle der Längenmasse.

	Normales Skelett	Das rachitische Skelett
Ganze Körperlänge	161.5 cm.	131.5 cm.
Länge der ganzen Wirbelfäule	69.7 "	59.6 "
Länge des Halstheiles	13.1 "	10.3 "
Länge des Brusttheiles	25.4 "	27.8 "
Länge des Lendentheiles	14.0 "	14.0 "
Vom promontorium bis zur Steissbeinspitze . . .	17.2 "	7.5 "
Schulterbreite	36.1 "	38.0 "
Längen der oberen Extremität rechts:		
Länge des humerus	33.7 "	16.2 "
Länge des radius	24.6 "	23.6 "
Länge der ulna mit olecranon	26.2 "	27.0 "
Länge der Hand	17.6 "	18.8 "
Längen der oberen Extremität links:		
Länge des humerus	33.7 "	17.2 "
Länge des radius	24.6 "	24.5 "
Länge der ulna mit olecranon	26.2 "	24.5 "
Länge der Hand	17.6 "	17.4 "
Beckenbreite zwischen cristae oss. il.	21.3 "	21.5 "
Beckenbreite zwischen spina ant. sup.	— "	22.0 "
conjugata vera	— "	5.4 "
diameter transversus	— "	10.8 "
Längen der unteren Extremität rechts:		
Länge des femur	46.0 "	28.2 "
Länge der tibia	38.0 "	30.4 "
Länge der fibula	36.5 "	32.6 "
Länge des rechten Fusses in der Axe der 1. Zehe	25.0 "	21.1 "
Länge des rechten Fusses in der Axe der 2. Zehe	23.8 "	21.9 "
Längen der unteren Extremität links:		
Länge des femur	46.0 "	21.1 "

	Normales Skelett	Das rachitische Skelett
Länge der tibia	38.0 „	30.2 „
Länge der fibula	36.5 „	33.1 „
Länge des linken Fusses in der Axe der 1. Zehe	25.0 „	20.1 „
Länge des linken Fusses in der Axe der 2. Zehe	23.8 „	20.5 „

Die auffälligsten Veränderungen des vorliegenden Skelettes sind diejenigen des Schädels und der Extremitäten, während der Brustkorb und die Wirbelsäule, soweit sie nicht zum Beckenringe gehört, nur geringgradige Deformitäten aufweisen.

Am Schädel fällt vor Allem die größere Zunahme des Längen- und Querdurchmessers der Schädelkapsel gegenüber dem Höhendurchmesser auf, wodurch die Kapsel von oben nach unten mehr plattgedrückt erscheint. Dieser Zustand ist wohl hervorgebracht durch den Druck des Gehirnes und den Gegendruck der Wirbelsäule bei aufrechter Haltung des Oberkörpers gegen die weiche Schädelbasis, welche denn auch mehr abgeflacht, am Hinterhauptbeine sogar in frontaler Richtung an ihrer unteren Fläche concav erscheint. Die Gesichtsknochen zeigen im Ganzen die in der allgemeinen Beschreibung der rachitischen Knochenveränderungen angeführten pathologischen Verhältnisse, denen auch der Beckenring im Großen und Ganzen folgt.

Sehr auffallend sind die Veränderungen an den Extremitäten und zwar zumeist an humerus und femur, während an Vorderarm und Unterschenkel die pathologischen Veränderungen unbedeutenderer Natur sind. Hier muß vor Allem neben den zahlreichen Infractionen, welche sich auch noch am Becken finden, auf die hochgradige Verkürzung der oben genannten Röhrenknochen und deren deformirte Epiphyfen aufmerksam gemacht werden. — Veränderungen, die wohl nur durch den Druck des Rumpfes auf die beim Rutschen und Kriechen des

betreffenden Individuums auf den Boden gestemmtten humeri und femora hervorgerufen sein können.

Zum Schlusse erübrigt mir noch die angenehme Pflicht, meinen hochverehrten Lehrern — Herrn Prof. Dr. Otto Bollinger für seine ausgezeichnete Güte, mit der er mir das Skelett zur Beschreibung überliefs, und für die vielen mir bei Anfertigung der Arbeit ertheilten Rathschläge — fowie Herrn Prof. Dr. N. Ruedinger für die gütige Ueberlassung der Masse des normalen Skelettes — meinen wärmsten Dank hier auszusprechen.

Benützte Literatur.

Cohnheim : „Vorlesungen über allgemeine Pathologie.“

Ziemssen : „Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie“. B. 13. I.

Elsässer : „Der weiche Hinterkopf.“ 1843.

Schmid : „Die rachitische Kieferdeformation und ihr Einfluss auf das Gebiss.“
Zeitschrift für Heilkunde B. I. Heft 2. 1880.

Zeitschrift für Biologie, 12. 1876.

Henoch : „Vorlesungen über Kinderkrankheiten.“

Virchow-Hirsch : Jahresberichte.
